

## العلاقة بين نوع الغذاء و التعرض للاصابة ببعض الطفيليات الخارجية لسمكة المرمريج *Mastacembelus mastacebelus* في بغداد

محمد عناد غزوان الجنابي\*

مركز بحوث و متحف التاريخ الطبيعي العراقي / جامعة بغداد.

### الخلاصة

جمعت 40 سمكة مرمريج من منطقتين مختلفتين في بغداد و بواقع 20 سمكة من كل منطقة الاولى من منطقة جسر المثنى، و الثانية من منطقة جسر ديالى القديم . تم استخلاص محتويات المعدة لهذه الاسماك و حلت بتقنية التحليل الضوئي للهام البروتيني المعزول Gel electrophoresis و اظهرت النتائج تقدم حزم الغذاء البروتيني من الاصل الحيواني و مطابقته لعينات الغذاء المجموع من بيئة تلك الاسماك الحقيقية، كما حدد نوعين من القشريات المتطفلة و تعد من اكثر الطفيليات الخارجية اصابة لهذه الاسماك و كانت ديدان الليرنيا *Leranea* من نوع *Learnea cyprinacea* و قمل الاسماك *Argulus* من نوع *Argulus foliaceus* ، هذا فيما يخص اسماك المرمريج من منطقة جسر المثنى، اما الاسماك التي جلبت من منطقة جسر ديالى فقد اصيبت بـ *Leranea* و خلت من الاصابة بـ *Argulus* كما ان شدة الاصابة باليرنيا في اسماك منطقة جسر ديالى كانت اقل من المنطقة الاولى. مما يدل على تباين انتشار القشريات المتطفلة على الاسماك في كلا المنطقتين بسبب اختلاف البيئة و سرعة جريان المياه اضافة الى اختلاف مواسم جمع الاسماك في كلا المنطقتين.

## The relationship between Feeding type and exposure to infection with some Ectoparasites of Marmarij *Mastacembelus mastacebelus* in Baghdad

### Summary

40 Mmermrij fish *Mastacembelus mastacebelus* were collected from different areas in Baghdad , a total of 20 fish from each area; the first 20 from area near a Al Muthanna bridge, and the second from the old Diyala bridge. stomach contents Were taken from these fish and analyzed by the Gel electrophoresis device results showed abundance of food protein of animal origin, which was identified with the food samples taken from the real environment of these fish. Also two types of parasitic crustaceans were identified which are considered the most common external parasites infected fish ; these were *Leranea* worms, type *Learnea cyprinacea*, and fish lice *Argulus*, type *Argulus foliaceus*, this is with respect to Almmermrij fish taken from Al Muthanna bridge region. As for the fish brought from the Jisr Diyala area; they were infected by *Leranea* and free of infection with *Argulus* , and the severity of infection with *Learnea* was lower than the first. which shows the disparity of the spread of parasitic crustaceans on fish in both areas because of the different environments and speed of the flow of water in addition to the different seasons of fishing in these two regions.

Ket words: Ectoparasites ,marmarij mastacembelus mastacebelus,diyala bridge,fish.

### المقدمة

يوجد 73 نوع من عائلة اسماك المرمريج *Mastacembelidae* تنتشر ما بين افريقيا و شرق كوريا و ماليزيا و كذلك في وسط ايران (1) و (2)، و تصل الى اطوال كلية لا تقل عن (1م). كما تنتشر اسماك المرمريج في عموم انهار العراق العذبة و تتباين من منطقة الى اخرى (3) . و تختلف تسمية هذه الاسماك شعبيا في العراق من منطقة الى اخرى منها المرمريج و زراف السفن و الشربطة و ام لسين و ثعبان السمك ... الخ من التسميات المحلية العراقية. كما تتواجد ايضا في نهر الفرات في سوريا خصوصا في حلب و عموم الانهار الجارية الاخرى (4) . و تتغذى اسماك المرمريج عموما على القشريات المائية الصغيرة ، الرخويات، الحشرات المائية الصغيرة، اضافة الى الاسماك الصغيرة و يرقات الاسماك و البيوض، كما اشار (5) اذ ان غذاء اسماك المرمريج في هور الحويضة لموسم من 2005-2006 كان (55%) من الروبيان الصغير و (45%) اسماك صغيرة كما دلت محتويات المعدة لهذه الاسماك على وجود قشور صغيرة لاسماك صغيرة في معدها.

لقد اشار (6) و(7) الى تحديد انواع من الطفيليات الداخلية والخارجية التي تصيب هذه الاسماك في بحيرة Zarivar وكانت الطفيليات الخارجية المشخصة هي لنوعين من القشريات المتطفلة وهي Argulus و Lernaea . وفي هذه الدراسة جمعت الاسماك من منطقتين مختلفتين في بغداد لدراسة مقارنة انتشار القشريات المتطفلة على هذه الاسماك كذلك الى التباين في غذاء هذه الاسماك من منطقتين مختلفتين و لموسمين مختلفين. كما لوحظ ان توفر الغذاء الطبيعي في منطقة جسر المثنى بشكل اوفر من منطقة جسر ديالى خصوصا الاسماك الصغيرة والقواقع المائية والتي تعد المادة الغذائية الاساسية لاسماك المرمريج يعد عاملا اساسيا لتوفر الاسماك في تلك المنطقة دون غيرها بسبب وجود الغذاء بكثرة، مما يزيد من عدد الاسماك في وحدة المساحة او المسطح المائي المجموعة منه الاسماك، وبالتالي التنافس على وفرة الغذاء يجعل من المنطقة اكثر اصابة من غيرها بالقشريات المتطفلة خصوصا عند موسم الربيع او اعتدال الجو ، و لجؤ هذه الاسماك الى المناطق النائية والهادئة لاتمام عملية التكاثر، اضافة الى توفر الوسيط (اسماك المرمريج) لتكاثر بعض القشريات المتطفلة ، وبأعداد كبيرة من الاسماك والقشريات المتطفلة خصوصا Lernaea ، في حين قل عدد الاسماك في منطقة جسر ديالى القديم بسبب عدم تواجد اساسيات تغذية هذه الاسماك من الغذاء الطبيعي خصوصا الاسماك الصغيرة ، و لوحظ بعد تشريح اسماك المرمريج المجموعة من منطقة جسر ديالى ان اغلب معد تلك الاسماك احتوت على القواقع و بيوض الاسماك ، مما يدل على بحث هذه الاسماك عن غذاء بديل يعوض عن الاسماك الصغيرة التي تعد من اهم اساسيات تغذية اسماك المرمريج، كما اشار الى ذلك (6). ولقد اشار (10) الى (11) اذ يصف العلاقة القائمة بين القشري المتطفل ومضيفه (الاسماك) تشتمل التغذي على حساب المضيف ، من اجل التكاثر للحفاظ على النوع بالاستعانة على الطاقة التي يحصل عليها هذا الطفيلي من المضيف (اسماك المرمريج) في هذا البحث. اضافة الى ان غذاء اسماك المرمريج والذي يتمثل بالاسماك الصغيرة بالدرجة الاساس تعد هذه الاسماك ايضا من النواقل لبعض القشريات المتطفلة و خصوصا Lernaea ، اذ تنقل البيوض او بعض اليرقات في طور نموها الابتدائي كما اشار الى ذلك (10).

### المواد وطرائق العمل

جمعت 40 سمكة مرمريج *M.mastacembelus* من منطقتين في بغداد الاولى من منطقة جسر المثنى اذ بلغ معدل الطول الكلي للاسماك (43سم) و معدل وزن (221غم)، اما المنطقة الثانية فكانت من جسر ديالى القديم اذ كان معدل الطول الكلي للاسماك (45سم) و معدل وزن (237غم)، و الجمع تم بموسمين مختلفين الاول عند بداية اذار و الثاني عند بداية الى منتصف ايار.

شرحت الاسماك بعمل شق طولي باتجاه البطن و استخرجت القناة الهضمية برفق من نهاية الفم عند بداية البلعوم الى نهاية المخرج و كان معدل طول القناة الهضمية لهذه الاسماك (30سم) و معدل وزن الاحشاء كاملة بدون تفريغ محتوياتها (10غم). كما لوحظ ان معظم الاناث المجموعة كانت ناضجة جنسيا اذ لوحظت البيوض داخل جسم الاناث بعضها قد اكتمل و البعض الاخر لم يكتمل بعد ، خصوصا عند الجمع الاول عند منتصف اذار الى نهايته. عزلت المعدة لهذه الاسماك و تم استخلاص محتوياتها بعد ان اخذت عينات من غذاء هذه الاسماك من بيئتها الحقيقية لاجراء المقارنة ما بين محتوى المعدة و البيئة لهذه الاسماك. اجريت عملية التحليل باستعمال الترحيل الكهربائي ، اذ تم تحضير هلام الفصل مكونة من (3%) من الهلام اللاصق و (10%) من هلام الفصل عن طريق كتلة محلول تحتوي على (30%) اكريلاميد وقد كانت التركيزات النهائية في المحلول المعزول كالاتي : M 0.375 ثلاثي HCl (pH 8.8) و (0.1%) SDS . وقد تم بلمرة الهلام كيميائيا من خلال اضافة (0.025%) من الحجم من تتراميثيلين ديامان و بيرسلفات الامونيوم و تم تحضير هلام بحجم (10) سم في انابيب زجاجية يبلغ طولها (15) سم وقطرها الداخلي (6) ملم . كما تم بلمرة الهلام اللاصق بنسبة (3%) من الاكريلاميد و بطول (1) سم والذي يحتوي على M 0.025 ثلاثي HCl (pH 8.8) و (0.1%) من SDS و تم بلمرتها بنفس الطريقة التي تم بها بلمرة هلام الفصل . وقد احتوى حوض الالكترود (pH 8.8) على M 0.025 تريس و M 0.0192 غليسين و (0.2-0.3) ملم ) فقد احتويتا على التراكيز النهائية ( مخزون العينة النهائي) M0.0625 ثلاثي HCl (pH 6.8) و (2% SDS - و 10% غليسيرول- و 3% ثاني ميراكابتينانول و 0.001 بروموفينول وكان ازرق يشبه الصبغة. وقد عزلت البروتينات بشكل كامل عن طريق وضع العينة لمدة دقيقة ونصف في الماء المغلي- و تم استخدام عملية الالكتروفر الكهروثابتة بتسليط تيار قدر 35 امبير لكل جل الى ان وصل مؤشر البروموفينول الازرق الى قاع الهلام (حوالي 3 ساعات) . و ثبت البروتين في الجل باستخدام 50% من ثلاثي كلوريد الاسيد طول الليل وقد تم الحصول على محلول ازرق لامع بنسبة 0.1% عند وصوله لدرجة حرارة 37 م من عند استخدام 50% تقريبا من ثلاثي كلوريد الاسيد. و غسل الهلام باستخدام 7% من حامض الاسيتيك. و جرى تحديد عدد الحزم المنفصلة في كل هلام باستخدام تقنية (2001) Photo Capt Molecular Weight Software.

عزلت القشريات المتطفلة على هذه الاسماك بوضع قطرة من الكحول بتركيز (70%) على موضع اتصال الطفيلي بجسم السمكة و رفعه بهدوء لعدم الضرر به قدر الامكان و حفظه في كحول (70%) الى حين تحضير السلايدات الخاصة بهذه الطفيليات كما جاء به (8) بعد حفظ الطفيلي في الكحول بتركيز (70%) يغسل بالماء لغرض ازالة بقايا الكحول قبل التصبيغ، اذ يوضع الطفيلي في صبغة ( Carmalum ) لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء و ينقل الطفيلي بعد ذلك الى كحول تركيز (70%) لمدة 20 دقيقة ثم الى كحول بتركيز (96%) لمدة 20 دقيقة اخرى ، بعد ذلك الى الكحول المطلق فأذا وجدت عكارة يعني ذلك عدم اكتمال سحب الماء من جسم الطفيلي و يعاد مرة اخرى الى الكحول تركيز (96%) لبعثرة دقائق و من ثم الى الكحول المطلق مرة اخرى، بعد تجفيف الطفيلي من الماء يثبت على السلايد باستعمال Canada balsam .

### النتائج و المناقشة

اظهرت نتائج التحليل بروتينات محتويات المعدة لاسماك المرمريج التي تم اصطيادها من كلا المنطقتين تطابقها مع اغلب حزم البروتين الحيواني الاصل كما يلاحظ من الشكل ( 3 ) اذ نلاحظ ان الهلام الذي على اليمين هو للبروتينات المنفصلة من محتوى معدة اسماك المرمريج من منطقة جسر المثني، اما الهلام الذي على اليسار هو للبروتينات المنفصلة من الغذاء الحيواني الاصل الموجود ضمن بيئة عيش هذه الاسماك في هذه المنطقة، كما نلاحظ من الشكل (4) نتائج الهلام لنفس الاسماك من منطقة جسر ديالى القديم ، و جاءت متطابقة جدا، كما يلاحظ من الشكل ( 5 ) المخطط البياني للبروتينات المهاجرة بطريقة الترحيل الكهربائي لكل من الغذاء الحيواني المجموع من بيئة تلك الاسماك و محتوى معدة تلك الاسماك من البروتينات الحيوانية الاصل . ان هذا التطابق في معظم الحزم للبروتين الحيواني الاصل مع غذاء معدة هذه الاسماك جاء ليؤكد ان سمكة المرمريج تعد من الاسماك اللاحمة Carnivorous و التي تتغذى على العديد من المصادر الغذائية الحيوانية مثل الحشرات المائية و الرخويات و القواقع و الروبيان اضافة الى الاسماك الصغيرة و البيوض و اليرقات. كما اشار الى ذلك ( 5 ) اذ وجد ان محتويات معدة هذه الاسماك في منطقة هور الحويزة لموسم 2005-2006 من الربيع حتى الصيف كانت ( 55%) روبيان صغير و ( 45%) اسماك صغيرة. في حين وجد في هذه الدراسة بقايا لقواقع صغيرة لم تهضم بعد من القواقع *Physa acuta* و بحجم (2ملم) و في بعض الاسماك الكبيرة الحجم وصل حجم القواقع المذكور الى (4ملم). كما وجدت بقايا لقواقع *Gyraulws sp.* بحجم (4ملم) خصوصا في مجموعة اسماك جسر ديالى، اضافة لوجود بقايا من اسماك الكمبوزيا *Gambusia sp.* الصغيرة الحجم و قشور لاسماك صغيرة الحجم.


بالنسبة للطفيليات الخارجية لوحظ وجود نوعين من القشريات المتطفلة و هي *Learnea* من نوع *Learnea cyprinacea* كما في الشكل (1)، و *Argulus* من نوع *Argulus foliaceus* كما في الشكل (2) ، و لقد تباينت الاصابة بين المنطقتين اذ لوحظ اصابة اسماك منطقة جسر المثني بـ *Learnea* و *Argulus* ، في حين خلت اسماك منطقة جسر ديالى من الطفيلي الاركلس و قلت شدة الاصابة باليرنيا لنفس المنطقة، كما يلاحظ من الجدول (1) ، و الاصابة بهذه الانواع من القشريات المتطفلة جاء مطابقا لما وجدته كل من (6) و (7) ، اذ اشار الى اصابة المرمريج بالقشريات المتطفلة من نوع *Learnea cyprinacea* و *Argulus foliaceus* في بحيرة Zarivar في ايران. كما ان معظم الاصابة بـ *Argulus foliaceus* كانت عند منطقة الغلاصم و الجلد و جاء مطابقا لما جاء به (9).



الشكل (1) و يوضح طفيلي *Learnea cyprinacea* مأخوذة من المصدر (9).




الشكل (2) يوضح الطفيلي *Argulus foliaceus* مأخوذة من المصدر (9).




2 1

الشكل (3) صورة لنمط الترحيل الكهربائي لبروتينات : 1: محتويات معدة اسماك المرمريج المحلية من منطقة جسر المثنى ، 2 : الغذاء الحيواني .



2 1

الشكل (4) صورة لنمط الترحيل الكهربائي لبروتينات : 1: محتويات معدة اسماك المرمريج المحلية من منطقة جسر ديالى ، 2 : الغذاء الحيواني .



2

1

الشكل (5) مخطط بياني للبروتينات المنفصلة بطريقة الترحيل الكهربائي : 1 : الغذاء الحيواني ، 2 : محتويات معدة اسماك المرمريج المحلية.

الجدول (1) يوضح شدة اصابة اسماك المرمريج في منطقتي جسر المثنى و جسر ديالى ببعض الطفيليات الخارجية

نسبة الإصابة بالطفيلي (%) في كلا المنطقتين في بغداد	طول الطفيلي	تواجده في اسماك المرمريج في منطقة جسر ديالى	تواجده في اسماك المرمريج في منطقة جسر المثنى	الاسم العلمي للطفيلي
60 %	21-18 ملم	+++	++++	<i>Lernaea cyprinacea</i>
20 %	8,5-8 ملم	-	+++	<i>Argulus foliaceuse</i>

اذ ان :

- عدم وجود الطفيلي في الاسماك المجموعة.

+ عزل طفيلي واحد.

++ عزل 5 طفيليات.

+++ عزل 2-10 طفيليات.

++++ عزل 11-15 طفيلي.

من هنا نستنتج ان اسماك المرمريج قد تباينت في الاصابة بالقشريات المتطفلة في منطقتين مختلفتين في بغداد وهذا قد يعود الى اختلاف مواسم الجمع التي جمعت بها تلك الاسماك ما بين بداية موسم التكاثر من منتصف اذار الى بداية موسم الصيف عند منتصف ايار ، و تباين انتشار القشريات المتطفلة بين المنطقتين و وجود قشريات متطفلة في منطقة و انعدام وجودها في منطقة اخرى ، مثل انعدام الاصابة بالاركلس في اسماك منطقة جسر ديالى القديم ، قد يعود الى قلة تواجد الاسماك في المنطقة الثانية (قلة عدد اسماك المرمريج) بسبب قلة توفر الغذاء مما يعود في تأثيره على تواجد الطفيلي بسبب قلة تنقله عن طريق وجود اعداد اكبر من الاسماك المضيضة كما اشار الى ذلك (6). كما يعود التباين بالاصابة بهذه الطفيليات الى الاختلاف في البيئتين بين هاتين المنطقتين و اختلاف طبيعة و حركة الماء ايضا في هاتين المنطقتين اذ ان الماء عند منطقة جسر ديالى القديم اكثر جريانا من سرعة الماء في منطقة جسر المثنى خصوصا عند جرف النهر من جهة الجسر و هو المكان الذي جمعت منه هذه الاسماك من تلك المنطقة. اما من ناحية المحتوى البروتيني لمعدة هذه الاسماك و من كلا المنطقتين فكان متطابق تقريبا باعتبار ان اسماك المرمريج من الاسماك المفترسة لذا يرتفع محتوى و مستوى البروتين في معدتها كما موضح سابقا في الشكلين (1) و (2). اما عن علاقة الطفيلي بغذاء اسماك المرمريج هو ان كلما كانت البيئة هادئة و حركة الماء بأنسياب هاديء و وفرة الغذاء الاساسي لهذه الاسماك ازداد تواجد الطفيلي ايضا باعتبار ان الظروف الملائمة للاسماك هي

ايضا ملائمة لنمو و انتشار هذا الطفيلي بأعتبار ان اسماك المرمرنج هي المضيف للطفيلي. و من نتائج ( 7 ) اكد ان في موسم الربيع ازدادت الاصابة بأسمك المرمرنج بالطفيلي *Learnea* بسبب ازدحام المنطقة بالاسماك بسبب التهيئة للتزواج مما شجع زيادة الطفيليات في تلك المنطقة بسبب زيادة اعداد الاسماك المضيفة و توفر البيئة الصالحة لكلا الطفيليات و اسماك المرمرنج .

#### المصادر

1. Berra TM(2001). *Freshwater Fish Distribution*.Academic Press,San Diego,xxxviii+604pp.
2. Forese,R and Pauly,D.(2004).FisheBase.World wid web electronic publication.www.fishbase.org.version (06/2004).
3. Al-Daham NK(1977). *Fishes of Iraq and the Arabian Gulf*.Volume 1.*Squaliformes to Atheriformes* , Publication 9,Centre for Arab Gulf Studies,University of Basrah.546pp.In Arabic.
4. Woo PTK(1995). *Fish diseases and disorders*.1<sup>st</sup> Edn.,Vol.1.*Protozoan and metazoan infictions* ,CAB International, UK.P:808.
5. Hussai NA and Ali TS(2006)."Trophic nature and feeding relationships among Al-Hammer marsh fishes",*southern Iraq.Marsh Bulletin*,1(1):9-18.
6. Jalali B Barzegar M and Nezamabadi H(2007). "Parasitic funa of spiny eel, *Mastacembelus mastacebelus* Banks et Solander (Teleostei: Mastacembelidae) in Iran", *Iranian J Veteri Res Shiraz University*.Vol.9,No.23,158-161.
7. .Jalali B and Barzegar M(2006)."Fish Parasites in Zarivar Lake" ,*J Agric Sci Technol* ,Vol.8:47-58.
8. Ali MD(2004). *Laboratory dignosis of fish diseases*, Al-Yaqtha Press,Baghdad,32pp. In Arabic.
9. Jalal B(1998),"Parasites and parasitic diseases of freshwater fishes of Iran",1<sup>st</sup> Edn.,*Fisheries Co. of Iran* , P:564.(In Persian).
10. Mhaisen F Thumad(1983). *Diseases and Parasites of Fishes*, University of Basrah Press,Basrah, IRAQ,pp 172.
11. Smith FG(1975). Crustacean parasites of marine fishes.In Ribelin,W.E.;& Migaki,G.(Eds.),pp.189-203.